

Opvolging na de behandeling

Na 2 weken en na 12 maanden komt u op controle en wordt een duplexonderzoek uitgevoerd. Indien nodig en op advies van de arts is meer opvolging mogelijk.

Administratieve regelingen

De behandeling wordt volledig door het ziekenfonds terugbetaald. De raadpleging wordt verrekend. U krijgt hiervan een attest voor uw ziekenfonds. Gebruikte materialen worden wel verrekend.

De steunkous, die een deel van het verband is, wordt afhankelijk van uw ziekenfonds al dan niet terugbetaald. Met de volgende drie formulieren kan u de terugbetaling van de kous aanvragen:

- factuur ziekenhuis (behandeling)
- factuur bandagist (kous)
- voorschrift steunkous dat u in het ziekenhuis meekrijgt

Contact

Voor meer informatie kan u terecht op de dienst thorax- en vaatheelkunde op het nummer 03 821 37 85. Indien nodig kunt u ook terecht bij de dokter van wacht van het UZA via 03 821 40 45.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Foamsclerotherapie

Behandeling van spataders

Informatiebrochure patiënten

© UZA, september 2018. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming Thorax- en vaatheelkunde, 2012/6



Kennis / Ervaring / Zorg



Beste patiënt

Welkom in het UZA. In deze folder leest u wat meer over foamsclerotherapie. Hebt u nog vragen, dan kunt u steeds terecht bij uw arts.

Foamsclerotherapie

Foamsclerotherapie wordt toegepast om spataders te behandelen. De arts prikt de ader rechtstreeks aan (met of zonder echogeïde) en spuit foam (schuim) in om de bloedstroom in de zieke ader uit te schakelen.

Voordelen

- meestal geen ziekenhuisopname nodig
- geen narcose
- geen insnijding in lies of been
- het werk kan snel hervat worden

Nadelen

- meerdere sessies kunnen nodig zijn
- het esthetisch resultaat kan enkele maanden op zich laten wachten door tijdelijke verkleuring van de huid en hardheid over het verloop van de behandelde ader

Zorg na de behandeling

Na de ingreep stapt u nog een 10-tal minuten rond in het ziekenhuis en meldt u zich aan op de raadpleging ter controle.

Compressietherapie

U krijgt een drukverband of steunkous afhankelijk van de behandelde plaats of uitgebreidheid.

Bloedsomloop stimuleren

- Beweeg veel: wandelen, fietsen, joggen, trappen, lopen...
- Vermijd lang rechtstaan of zitten gedurende de eerste 2 weken.
- Geen lange autoritten gedurende 2 weken of vliegreizen gedurende 4 weken.
- Ga niet gehurkt zitten (dit knelt de aders af).
- Let op dat er geen plooien in de kous ontstaan, dit kan de ader afknellen.

Mogelijke klachten

De volgende klachten kunnen voorkomen, maar zijn

normaal en tijdelijk:

- roodheid, warmte en pijnlijk gevoel over het verloop van de behandelde ader (lijkt op een ontsteking).
- pijnlijke streng of verdikking ter hoogte van de ader.
- verkleuring van de behandelde zone gedurende meerdere maanden.
- brandend of trekkend gevoel ter hoogte van de behandelde zone.
- contacteer de huisarts of behandelende arts bij: ernstige roodheid, erge pijn, koorts, plotse zwelling van been of kuit.

Medicijnen

- Thuismedicatie kan u gewoon verder nemen (ook bloedverduuners).
- Bij **pijn** mag u Dafalgan 500 mg nemen, maximaal 6 tabletten per dag. Breng eventueel Reparil gel 1% op de pijnlijke zone aan. Verkoeling met ijs kan de pijn verzachten: leg de ijszak nooit rechtstreeks op de huid maar wikkel hem in een handdoek.