

Opgelet

U kunt geen plexus coeliacus blokkade ondergaan, wanneer:

- u zwanger bent (vanwege gebruik van röntgenapparatuur)
- u ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling (maak een nieuwe afspraak)

Meld voor het maken van een afspraak aan uw arts:

- of u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof, latex of verdoving
- of u antistollingsmedicatie gebruikt. Uw pijnspecialist bespreekt met u het gebruik van deze medicatie.

Wat zijn mogelijke neveneffecten?

Soms voelt u gedurende enkele dagen pijn door de behandelvloeistof. Dit verdwijnt vanzelf. U kunt hier tegen pijnstillers of uw eigen pijnmedicatie innemen.

U kunt ook last hebben van voorbijgaande diarree, bloeddrukval en duizeligheid. De blokkade gebeurt net onder de borstkas. Daardoor is er een klein risico dat de long aan-geprikt wordt (klaplong). Een controlefoto van de longen is dan nodig. Soms treedt een stoornis in de blaasfunctie op, waardoor een blaaskatheter nodig is. Dit is meestal van tijdelijke aard. In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie (verlamming van de benen), bloed in de urine of schouderpijn optreden.

U moet de pijnstillers blijven doornemen. De ingreep zorgt voor een vermindering van de klachten. Bespreek met uw arts of de dosis pijnstillers verminderd mag worden.

Wat na de procedure?

Na de inspuiting moet u een uurtje rusten in de recovery of ontwaakzaal. Als alles in orde is, haalt een verpleegkundige van het dagziekenhuis u op. In de loop van de dag komt de pijnspecialist bij u langs. Als alles in orde is, mag u naar huis. Doe het rustig aan op de dag van de behandeling en verricht geen zwaar werk.

Na enkele weken volgt een controleafspraak met uw pijnspecialist in het pijncentrum. U vult een evaluatie-formulier in en bezorgt dit aan het secretariaat van het pijncentrum.

Contact

Het multidisciplinair pijncentrum is bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur op het nummer + 32 3 821 35 86.

Bij dringende gevallen buiten de kantooruren kunt u de wachtdienst van het pijncentrum contacteren via de telefooncentrale van het UZA +32 3 821 30 00.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Plexus coeliacus blokkade

Informatiebrochure patiënten

© UZA, maart 2018. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Pijncentrum 220/824



Kennis / Ervaring / Zorg




Beste patiënt

Welkom in het pijncentrum van het UZA. Binnenkort ondergaat u een 'plexus coeliacus blokkade'. In deze folder vindt u meer informatie ter voorbereiding. Hebt u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.


Wat is een plexus coeliacus blokkade?

De **plexus coeliacus** is een zenuwnetwerk in de bovenbuik. De zenuwen kunnen pijnklachten vanuit de ingewanden in de bovenbuik (zoals alveesklier, maag, lever) veroorzaken.



Figuur 1 - Plexus Coeliacus

Een **plexus coeliacus blokkade** is een onderbreking van dit zenuwnetwerk. De arts spuit hierbij een stof in het zenuwnetwerk, waardoor de pijn prikkel de hersenen niet meer kan bereiken. Dit vermindert de pijn en/of het medicatieverbruik.



Figuur 2 - De infiltratie van plexus Coeliacus

Hoe verloopt de procedure?

U meldt zich op de dag van de behandeling aan het onthaal van het ziekenhuis. Na het aanmelden gaat u naar de afdeling dagopname. Na een intakegesprek begeleidt de verpleegkundige u naar de behandelkamer. De zorgverleners vragen geregeld uw naam en geboortedatum en bepaalde medische gegevens (zoals allergie, diabetes, inname van antistollingsmedicatie, mogelijke zwangerschap).

In de behandelkamer zijn uw behandelend arts en zijn team aanwezig, soms ook studenten. Voor de behandeling krijgt u een infuus voor de toediening van geneesmiddelen.

U gaat op uw buik liggen met een kussen eronder. De juiste plaatsbepaling van de proefblokkade gebeurt door een röntgenapparaat. Uw huid wordt ontsmet met een koude, rode vloeistof. De huid wordt plaatselijk verdoofd, waarna de arts onder röntgendoorlichting (via de televisiemonitor) de naalden op de juiste plaats brengt.

Na het plaatsen van de naald(en) spuit de arts de behandelvloeistof in rondom het zenuwnetwerk. Bij een definitieve plexus coeliacus blokkade zorgt de arts voor een langdurige blokkade van de zenuwplexus met een etsende vloeistof (alcohol) of warmte.

De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. Maar als het liggen op de buik te zwaar is voor u of te veel pijn doet, kan de behandeling ook onder volledige verdoving (in de operatiekamer).


De behandeling duurt ongeveer een half uur en het resultaat van de blokkade wordt pas na één à twee dagen duidelijk. Soms is er nadien nog een bijkomende behandeling nodig.

Hoe bereidt u zich best voor?

U moet nuchter zijn: u mag niet eten en drinken voor de ingreep. Tot twee uur voor de ingreep mag u wel zuiver plat water drinken (geen koffie/melk/fruitsap).

Meestal duurt uw opname 24 uur, neem dus zeker nachtkledij mee. Soms kunt u dezelfde dag weer naar huis. Draag geen juwelen en laat waardevolle voorwerpen thuis.

Zorg dat iemand u naar huis kan brengen na het ontslag uit het ziekenhuis (een dag na de procedure). Uw begeleider mag vanwege de privacy van andere patiënten en om medische redenen (stralingsbelasting, steriliteit) niet mee naar de behandelkamer of de recovery/ontwaakzaal.



Figuur 3 - De bezeniging van de organen door plexus Coeliacus.