

Na het onderzoek

U mag het eerste uur na het onderzoek niet eten en drinken. De keelverdooving moet namelijk volledig uitgewerkt zijn om verslikking te vermijden.

Nadien kan u best eerst wat water drinken en als dit probleemloos gaat, mag u weer normaal eten en drinken.

Belangrijk voor niet-gehospitaliseerde patiënten

Indien u tijdens het onderzoek een kalmeringsmiddel toegediend krijgt, mag u gedurende de rest van de dag niet autorijden of toestellen bedienen. Het is bijgevolg verplicht u te laten ophalen en begeleiden.

Contact

Kunt u een afspraak niet nakomen? Meld dit dan tijdig aan de raadpleging cardiologie.

Hebt u nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om de verpleegkundige of arts te contacteren.

Raadpleging cardiologie	03 821 35 38
Echocardiografie	03 821 36 68

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Drie Eikenstraat 655 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Slokdarmechocardiografie

Informatiebrochure patiënten

© UZA, september 2021. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Cardiologie-1865981



Beste patiënt,

Welkom op de dienst cardiologie van het Uza. Deze brochure biedt wat meer informatie over een echografie langs de slokdarm (slokdar Mechocardiografie).

We proberen u een zo volledig mogelijk beeld te geven van het onderzoek. Hebt u na het lezen van de brochure nog vragen, dan kunt u steeds terecht bij uw arts of verpleegkundige.

Doel van dit onderzoek

Met een slokdarmechocardiografie kunnen we de verschillende structuren van het hart beter zien dan met een uitwendige (transthoracale) echografie. Sommige hartproblemen kunnen we alleen op deze wijze opsporen. Het gaat ondermeer om het opsporen van aandoeningen aan het hart, de hartkleppen of bloedvaten.

De techniek

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, brengt de arts een endoscoop (een plooibaar buisje met aan het uiteinde een echoapparaatje) in de slokdarm. Omdat het hart juist vóór de slokdarm ligt, kan het zeer nauwkeurig in beeld gebracht worden. Dit gebeurt door middel van ultrageluidsgolven (echo).

Vorbereiding

- **Nuchter**

Het is van het grootste belang 6 uur voor het onderzoek nuchter te zijn, d.w.z. niet eten en niet drinken.

- Bij een onderzoek dat 's morgens plaatsheeft: nuchter blijven vanaf middernacht.
- Bij een onderzoek dat in de namiddag plaatsheeft: een licht ontbijt vóór 8 uur en daarna nuchter blijven.

Patiënten met suikerziekte moeten vooraf met hun arts overleggen over het nemen van de medicijnen.

- **Tandprothesen**

Alle losse prothesen moeten uit de mond verwijderd worden vóór het begin van het onderzoek. Dit is om te vermijden dat zij tijdens het onderzoek loskomen en problemen veroorzaken.

- **Slikstoornissen**

Indien u slikstoornissen of een slokdarmletsel hebt, of geopereerd bent aan de slokdarm of de keel dan moet u dit vóór het onderzoek melden aan de behandelende arts.

Als u in het verleden bij een dergelijk onderzoek problemen hebt ondervonden, breng ons dan hiervan op de hoogte.

- **Allergie**

Indien u allergisch bent voor plaatselijke verdovingsmiddelen, kalmeermiddelen en latex, gelieve dit dan vooraf te melden.

Verloop van het onderzoek

De dag van het onderzoek biedt u zich nuchter aan op de raadpleging cardiologie.

Voor het onderzoek wordt een infuus via een ader in de arm geplaatst. Dit is nodig om eventueel geneesmiddelen te kunnen toedienen.

Er worden elektroden op de borst gekleefd om het hartritme te kunnen volgen. Bloeddruk en zuurstofgehalte worden eveneens gevolgd.

Vervolgens wordt uw keel met een spray verdoofd. Tijdens het onderzoek kunt u normaal ademen.

Zo nodig kan een kalmeringsmiddel toegediend worden.

Het onderzoek zelf duurt 10 à 20 minuten.

Uw behandelende arts ontvangt de uitslag van het onderzoek.