

Contact

Contacteer in volgende gevallen de **verpleging fertilititeit** via **03 821 30 83** (binnen de werkuren):

- Bij hevig bloedverlies (d.w.z. elke 15 minuten verband moeten wisselen)
- Ondraaglijke buikpijn ondanks pijnstilling
- Klachten van duizeligheid
- Koorts hoger dan 38,5°C (zonder daling van de temperatuur na Paracetamol in te nemen)

Buiten de werkuren kan u zich aanmelden op onze **dienst spoedgevallen**.

© UZA, december 2023. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. CRG: 2989145



Cytotec

Inname bij vroeg miskraam

UZA / Drie Eikenstraat 655 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be



UZA'

Kennis / Ervaring / Zorg

UZA'

Toediening en dosage

Vaginaal

Maak uw vingers nat met water en plaats 's ochtends 4 tabletten Cytotec van 200 mcg zo diep mogelijk in de vagina. Tracht het eerste halfuur na plaatsing niet naar het toilet te gaan. Als u na het eerste halfuur de tabletten terug verliest, kan dit geen kwaad, de actieve stof is inmiddels ingewerkt.

Merkt u na 3 uur nog geen bloedverlies of buikkrampen, plaats dan nogmaals 4 tabletten Cytotec van 200 mcg vaginaal.

Sublinguaal

De toediening gebeurt bij voorkeur vaginaal, maar soms raadt de gynaecoloog aan de tabletten sublinguaal in te nemen. Plaats 's ochtends 3 tabletten Cytotec van 200 mcg onder uw tong en laat ze smelten. Helaas lossen deze tabletten slecht op. Daarom drinkt en eet u best iets nadat de tabletten opgelost zijn.

Merkt u na 3 uur geen bloedverlies of buikkrampen, neem dan nog eens 3 tabletten Cytotec van 200 mcg in.

Controle

Na 1 week voeren we een controle uit met bloedafname en een vaginale echo tijdens de ochtendmonitoring.

Effect en nevenwerkingen

Na inname van Cytotec zal er bij 71% van de patiënten na 3 dagen expulsie opgetreden zijn. Het proces begint met minimaal bloedverlies en menstratiepijn, maar op het moment van expulsie is er ruim en hevig bloedverlies gedurende 2 tot 4 uur (zoals bij een menstruatie). Dit gaat gepaard met intense buikkrampen. Na de expulsie ervaren de meeste patiënten nog aanhoudende menstratiepijn en minimaal bloedverlies gedurende 2 weken.

- Mogelijke neveneffecten zijn misselijkheid, braken, diarree en een lichte verhoging van lichaamstemperatuur tot 38 °C.
- Combineer deze tabletten niet met magnesium en niet met maagzuurremmers die magnesium bevatten zoals Riopan en Rennie. (Gaviscon kan wel ingenomen worden)

Pijnstilling

Neem indien nodig Paracetamol 1 g tot maximaal 4x/dag. Indien u geen beterschap ervaart met Paracetamol, kan u Ibuprofen 400 mg tot maximaal 3x/dag innemen.