

## Contact

Heeft u een dringende medische vraag over uw zwangerschap (bloedverlies, buikpijn, minder leven voelen, vroegtijdige weeën, vochtverlies, hoofdpijn, ...) of u voelt zich ongerust?

Meld u aan bij de **vroedkundige** via tel. **03 436 80 88** (maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur) voor een dringende controle op gynaecologie, route 29. Een gespecialiseerde verloskundige zal u opvangen.

Buiten deze uren kan u ook steeds terecht op **spoedgevallen**.

© UZA, mei 2023. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Gynaecologie, 2320441



## Cytotec

Inname bij vroeg miskraam

UZA / Drie Eikenstraat 655 / 2650 Edegem  
Tel +32 3 821 30 00 / [www.uza.be](http://www.uza.be)



**UZA'**

Kennis / Ervaring / Zorg

**UZA'**

## Toediening en dosage

### Vaginaal

Maak uw vingers nat met water en plaats 's ochtends 4 tabletten Cytotec van 200 mcg zo diep mogelijk in de vagina. Tracht het eerste halfuur na plaatsing niet naar het toilet te gaan. Als u na het eerste halfuur de tabletten terug verliest, kan dit geen kwaad, de actieve stof is inmiddels ingewerkt.

Merkt u na 3 uur nog geen bloedverlies of buikkrampen, plaats dan nogmaals 4 tabletten Cytotec van 200 mcg vaginaal.

### Sublinguaal

De toediening gebeurt bij voorkeur vaginaal, maar soms raadt de gynaecoloog aan de tabletten sublinguaal in te nemen. Plaats 's ochtends 3 tabletten Cytotec van 200 mcg onder uw tong en laat ze smelten. Helaas lossen deze tabletten slecht op. Daarom drinkt en eet u best iets nadat de tabletten opgelost zijn.

Merkt u na 3 uur geen bloedverlies of buikkrampen, neem dan nog eens 3 tabletten Cytotec van 200 mcg in.

## Controle

Na 1 week komt u op afspraak voor een bloedafname en vaginale echo.

## Effect en nevenwerkingen

Na inname van Cytotec zal er bij 71% van de patiënten na 3 dagen expulsie opgetreden zijn. Het proces begint met minimaal bloedverlies en menstratiepijn, maar op het moment van expulsie is er ruim en hevig bloedverlies gedurende 2 tot 4 uur (zoals bij een menstruatie). Dit gaat gepaard met intense buikkrampen. Na de expulsie ervaren de meeste patiënten nog aanhoudende menstratiepijn en minimaal bloedverlies gedurende 2 weken.

- Mogelijke neveneffecten zijn misselijkheid, braken, diarree en een lichte verhoging van lichaamstemperatuur tot 38 °C.
- Combineer deze tabletten niet met magnesium en niet met maagzuurremmers die magnesium bevatten zoals Riopan en Rennie. (Gaviscon kan wel ingenomen worden)

## Pijnstilling

Neem indien nodig Paracetamol 1 g tot maximaal 4x/dag. Indien u geen beterschap ervaart met Paracetamol, kan u Ibuprofen 400 mg tot maximaal 3x/dag innemen.