

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

- De beeldvorming van de vaste fase duurt ongeveer 2.10 uur, onderbroken door verschillende pauzes. U moet tijdens het onderzoek zo goed mogelijk blijven stil staan of zitten.
- De vloeistof voor de vloeibare fase smaakt zout. Desondanks vragen wij u deze kordaat op te drinken.
- Er zijn geen bijwerkingen beschreven op de licht radioactieve stof. De stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.



Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Contact

Dienst nucleaire geneeskunde
Tel.: 03 821 35 68
Fax: 03 821 58 92

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Drie Eikenstraat 655 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Kennis / Ervaring / Zorg



Maagontledigingsonderzoek

Informatiebrochure patiënten

© UZA, juli 2022. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Nucleaire geneeskunde-2320393



Beste patiënt,

U ondergaat binnenkort een maagontledigingsonderzoek. Deze brochure geeft u meer informatie over het onderzoek en hoe u zich moet voorbereiden.

Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige. U vindt onze contactgegevens achteraan. We helpen u graag verder.

Het team nucleaire geneeskunde

Wat is een maagontledigingsonderzoek?

Een maagontledigingsonderzoek is een onderzoek waarbij we met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof, ook wel tracer genoemd, de snelheid waarmee de maag zich ledigt kunnen beoordelen. We voeren dit onderzoek uit na het eten en/of drinken van een proefmaaltijd waarin deze tracer aangebracht werd.

Hoe bereidt u zich voor?

- U moet minstens 8 uur nuchter zijn voor het onderzoek. Zuigelingen moeten niet nuchter te zijn.
- Gezien interferentie met sommige medicatie, zal uw verwijzende arts u vragen eventueel volgende medicatie tijdelijk te stoppen:
 - Metoclopramide
 - Domperidon
 - Cimetidine
 - Parasympatholytica
 - Sympathomimetica

- Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap of borstvoeding. Overleg met uw arts. Zeg ons op voorhand als u mogelijk zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding van het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten.

Waar meldt u zich aan?

Komt u voor het eerst naar het UZA, bent u verzekerd in het buitenland of niet verzekerd?

Meld u aan met uw identiteitskaart en aanvraagformulier bij de inschrijvingsbalie of -kiosk in de inkomhal. Na inschrijving gaat u naar de dienst nucleaire geneeskunde (route 11). Meld u hier opnieuw aan.

Bent u verzekerd in België en reeds gekend in het UZA?

Ga rechtstreeks naar de dienst nucleaire geneeskunde (route 11). Meld u hier aan met uw identiteitskaart en aanvraagformulier.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

- Voor het bestuderen van de maagontlediging voor vaste stoffen krijgt u een standaard maaltijd aangeboden, welke bestaat uit 2 sneden wit brood met een gebakken ei ertussen. Na de vaste maaltijd krijgt u nog een beker water te drinken. U heeft ongeveer 10 minuten de tijd om de maaltijd in te nemen.
- Voor het bestuderen van de maagontlediging voor vloeibare stoffen krijgt u een zoute vloeistof aangeboden die u dient te drinken.

- Het onderzoek van de maagontlediging voor vaste stoffen en vloeibare stoffen kunnen niet op één dag samen uitgevoerd worden.

Het onderzoek

- Na het nuttigen van de standaard maaltijd zal u op bepaalde tijdstippen gedurende 2 uur in rechtopstaande of zittende houding tussen de camerakoppen geplaatst worden. We nemen een foto van de slokdarm-, maag- en darmstreek om zo de spijsvertering van deze standaardmaaltijd te kunnen volgen. In totaal worden er 5 opnames genomen van tekens 30 seconden. Het volledige onderzoek duurt ongeveer 2.10 uur.
- Tussen de verschillende foto's door mag u niets meer eten of drinken en moet u rustig blijven zitten. U mag gerust wat lectuur inkijken maar liefst niet rondlopen.
- Voor het bestuderen van de maagontlediging voor vloeibare stoffen zal er na het drinken van de zoute vloeistof gedurende 20 minuten een foto genomen worden van de slokdarm-, maag- en darmstreek om zo de spijsvertering van deze vloeibare maaltijd te kunnen volgen.
- Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil staan of zitten en adem rustig in en uit.

Na het onderzoek

- U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
- U mag gewoon eten en drinken.
- Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer (vb. samen televisie kijken met het kind op de schoot).