

U ondergaat een hysterosalpingografie (HSG)

Beeldvorming van baarmoeder en eileiders

Informatiebrochure patiënten

Beste patiënt,

Welkom op de dienst radiologie van het UZA. U ondergaat binnenkort een hysterosalpingografie of 'HSG', een röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders met contraststof. In deze folder vindt u wat meer uitleg over het wat en het waarom, het verloop en de zorg bij het onderzoek.

Hebt u nog vragen? Stel ze dan zeker aan uw arts of verpleegkundige.

Hysterosalpingografie of 'HSG'

Bij dit radiologisch onderzoek worden de baarmoeder (uterus) en de eileiders (tuba uterina) zichtbaar gemaakt door middel van contrastvloeistof. Met behulp van radiografische doorlichting verschijnen er beelden van uw baarmoeder en eileiders op het scherm.

Via dit onderzoek sporen we eventuele afwijkingen van de baarmoeder op en bekijken we de doorgankelijkheid van de eileiders. Meestal gebeurt dit onderzoek bij het in kaart brengen van vruchtbaarheidsproblemen.

Aandachtspunten

- Het onderzoek moet tussen 6 en 9 dagen na de eerste dag van uw menstruatie gebeuren.
- Bent u mogelijk zwanger? Meld dit dan zeker aan de verpleegkundige!
- Neemt u anticoagulantia (antistollingsmiddelen)? Meld dit dan aan de verpleegkundige.
- Bent u allergisch voor jodiumhoudende contrastvloei-stoffen? Verwittig dan vooraf de dienst radiologie om de nodige voorbereidingen te treffen.
- Eventueel kunt u vooraf een pijnstiller nemen (geen Aspirine®).

Vorbereiding

1. Meld u op de dag van uw onderzoek aan bij het onthaal van de dienst radiologie voor uw inschrijving.
2. Ga naar wachtkamer 5.
3. De verpleegkundige brengt u naar de omkleedruimte. U krijgt een onderzoekshemdje om aan te trekken. Uw broek, rok en slip moet u uitdoen.

Verloop

1. De verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte. U gaat op de onderzoekstafel liggen.
2. Eerst maakt de arts-radioloog een overzichtsonname van de buik.
3. Vervolgens brengt hij/zij met behulp van een speculum (eendenbek) een fijn buisje (katheter) in de baarmoeder. De arts spuit de contrastvloeistof via dit fijne buisje in de baarmoeder terwijl er röntgenfoto's worden gemaakt.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

Gewaarwording

Een hysterosalpingografie is weinig aangenaam om te ondergaan. Het inspuiten van de contrastvloeistof kan pijnlijk zijn. Toch is het een eenvoudig onderzoek met weinig risico's. U kunt vooraf wel een pijnstiller nemen (geen Aspirine ®).

Nazorg

- Na het onderzoek krijgt u een washandje en een handdoek om u op te frissen.
- U krijgt ook een maandverband om bloedverlies en contrastmiddel op te vangen.
- Het onderzoek kan krampen veroorzaken die lijken op menstruatiepijn. U mag een pijnstiller nemen (geen Aspirine®).
- Wat bloedverlies na het onderzoek is normaal. Duurt het langer dan 3 dagen? Raadpleeg dan uw gynaecoloog of huisarts.
- Hebt u hoge koorts? Raadpleeg dan uw gynaecoloog of huisarts. Dit komt uiterst zelden voor.

Resultaten



De resultaten worden besproken tijdens uw volgende raadpleging op de dienst fertiliteit of bij uw aanvragende arts.

Contact

Voor afspraken en informatie kunt u terecht op
tel. 03 821 48 48.

Dienst radiologie, route 143, 2^{de} verdieping

*Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.*

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

