

Een PICC katheter

Naar huis met antibiotica via de bloedbaan

Beste patiënt,


Hieronder geven we u graag meer informatie over uw PICC katheter.

Wat is een PICC katheter?

Een PICC (Perifeer Geïntroduceerde Centrale Katheter) katheter wordt via een ader in de bovenarm in de bloedbaan ingebracht en komt uit in de rechter voorkamer van het hart. Een PICC katheter is 40 cm lang en wordt geplaatst door een anesthesist onder lokale verdoving met een echografie. De katheter kan, indien nodig, zes maanden tot één jaar ter plaatse blijven.

Waarom heeft u een PICC katheter?

Met een PICC katheter creëren we een intraveneuze toegang waarlangs antibiotica voor een langere tijd toegediend kan worden. De tip van deze katheter zit in een breder bloedvat. Dat is nodig om de kans op irritatie of ontsteking bij toediening van bepaalde types antibiotica te verminderen. Aangezien de PICC katheter langer ter plaatse kan blijven zitten dan een klassieke katheter in de onderarm, hoeft u tijdens deze antibioticabehandeling niet meermaals geprikt te worden voor een nieuwe katheter.



Wekelijkse controle

Tijdens de wekelijkse controle in het ziekenhuis worden het verband en de fixatiepleister van uw PICC katheter vervangen. We geven ook nieuw materiaal en medicatie mee zodat u voldoende heeft tot de volgende consultatie.

Aandachtspunten

Let op bij volgende zaken:

- Tekens van mogelijke infectie aan of rond het insteekpunt: roodheid, zwelling, warmtegevoel, etter, pijn
- Plotse zwelling van de bovenarm waarin de PICC katheter geplaatst is
- Huiduitslag
- Hoofdpijn
- Maag-en darmklachten
- Plotse koorts (temperatuur > 38,3°C) of koude rillingen
- Problemen tijdens het inlopen het antibioticum of het doorspoelen van de katheter (vertraagd, pijnlijk,...)

Ervaart u één van deze problemen, neem dan contact op met de correcte persoon (zie punt 3.5 in bijhorende patiëntenbrochure).

- Zwemmen of een bad nemen met de PICC katheter is verboden. Douchen is toegestaan indien u de katheter droog kan houden (eventueel uw verband omwikkelen met huishoudfolie). Als uw katheter of verband toch per ongeluk nat wordt, neem dan contact op met de thuisverpleegkundige. Wij voorzien materiaal voor een éénmalige verbandwissel.
- Meet uw bloeddruk niet aan de arm waar de PICC geplaatst is.
- Bij bevuilding van het verband of lekkage van de katheter, neem contact op met de thuisverpleegkundige.

UZA / Drie Eikenstraat 655 / 2650 Edegem

Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook  en twitter 

